

UPUTA ZA PACIJENTA

LUPOCET FLU FORTE

500 mg + 250 mg + 1,41 mg

šumeća tableta

paracetamol, askorbatna kiselina, klorfenamin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. Što je LUPOCET FLU FORTE i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FLU FORTE
3. Kako uzimati LUPOCET FLU FORTE
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET FLU FORTE
6. Dodatne informacije

1. ŠTO JE LUPOCET FLU FORTE I ZA ŠTO SE KORISTI

LUPOCET FLU FORTE primjenjuje se u odraslih i djece starije od 12 godina za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe djelovanjem triju djelatnih tvari: paracetamola, klorfenamina i askorbatne kiseline.

Simptomi gripe uključuju curenje i svrbež nosa, suzne oči, promuklost, kašalj, glavobolju, vrućicu i iscrpljenost.

LUPOCET FLU FORTE sadrži tri djelatne tvari koje imaju različito djelovanje:

- **paracetamol** ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu
- **klorfenamin** smanjuje začepljenost nosa, ublažava simptome curenja iz nosa i suznih očiju
- **askorbatna kiselina** (vitamin C) nadoknađuje povećane potrebe za ovim vitaminom kod akutnih virusnih infekcija.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LUPOCET FLU FORTE

Nemojte uzimati LUPOCET FLU FORTE:

- ako ste alergični na djelatne tvari lijeka (paracetamol, klorfenamin ili askorbatnu kiselinu), ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na neki drugi sličan lijek (npr. antihistaminike - lijekove koji se koriste u liječenju različitih alergija)
- ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dio **Trudnoća, dojenje i plodnost**)
- ako bolujete od nedostatka enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze, ili teške hemolitičke anemije
- ako imate teški poremećaj rada jetre
- ako bolujete od glaukoma (povišenog očnog tlaka)
- ako imate hipertrofiju (povećanje) prostate, opstrukciju (suženje) vrata mokraćnog mjehura, stenozu pilorusa ili dvanaesnika (suženja dijela želuca ili dvanaesnika), ili neko drugo suženje probavnog ili mokraćno-spolnog sustava.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET FLU FORTE:

- ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom
- ako ste osoba starije životne dobi (65 godina i više) s poremećajem rada bubrega i/ili jetre
- ako ste imali ili imate bubrežne kamence
- ako imate hemokromatozu (pretjerano taloženje željeza u jetri i drugim organima)
- ako imate poremećaj u stvaranju krvnih stanica (*thalassaemia major*, sideroblastična anemija)
- ako bolujete od teških bolesti, uključujući teško oštećenje bubrega ili sepsu (kada bakterije i njihovi toksini cirkuliraju u krvi, što dovodi do oštećenja organa) ili ako patite od pothranjenosti, kroničnog alkoholizma ili ako ujedno uzimate flukloksacilin (antibiotik). Ozbiljno stanje koje se naziva metabolička acidoza (poremećaj krvi i tekućine) zabilježeno je u bolesnika u tim situacijama kada se paracetamol primjenjuje u redovitim dozama tijekom duljeg razdoblja ili kad se paracetamol uzima zajedno s flukloksicilinom. Simptomi metaboličke acidoze mogu uključivati: ozbiljne poteškoće s disanjem koje uključuju duboko ubrzano disanje, omamljenost, mučninu i povraćanje.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET FLU FORTE se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina zbog visoke pojedinačne i dnevne doze paracetamola. Za djecu u dobi 6 do 12 godina namijenjene su LUPOCET FLU šumeće tablete.

Drugi lijekovi i LUPOCET FLU FORTE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o svim lijekovima koje uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Tijekom primjene LUPOCET FLU FORTE tableta **nemojte** primjenjivati neki drugi lijek protiv gripe i prehlade ili neki drugi lijek koji sadrži paracetamol jer se na taj način povećava opasnost od prekoračenja preporučene dnevne doze paracetamola.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom prije primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta:

- *rifampicin* (lijek za liječenje tuberkuloze)
- *cimetidin* (lijek za liječenje žgaravice i drugih poremećaja probavnog sustava koji nastaju zbog prekomjernog lučenja želučane kiseline)
- *glutetimid*, *fenobarbiton*, *karbamazepin* (lijekovi za liječenje epilepsije)
- *amikacin*, *gentamicin* i *netilmicin* (lijekove za liječenje bakterijskih infekcija)
- *tricikličke antidepressive* (lijekove za liječenje depresije)
- *neuroleptike*, *sedative*, *trankvilizatore* (lijekove za smirenje)
- *barbiturate*, *hipnotike* (lijekove za spavanje)
- *antikoagulanse* (lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi)
- *metoklopramid* (lijek protiv mučnine i povraćanja)
- *oralne kontraceptive* (lijekove za sprječavanje začeća)
- *inhibitore monoaminoooksidaze* - MAO-inhibitore (lijekove za liječenje nekih vrsta depresije) u posljednja 2 tjedna
- *flukloksacilin* (antibiotik), zbog ozbiljnog rizika od poremećaja krvi i tekućine (poznatog kao metabolička acidoza) koji se mora hitno liječiti (vidjeti dio 2.)

LUPOCET FLU FORTE s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon obroka.

Tijekom uzimanja LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta **nemojte** konzumirati alkoholna pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudnica ili dojilja, odnosno ako sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, **ne smijete** uzimati LUPOCET FLU FORTE.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET FLU FORTE može uzrokovati umor, pospanost i vrtoglavicu. Ako imate ovakve simptome, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

LUPOCET FLU FORTE sadrži aspartam.

Ovaj lijek sadrži 40 mg aspartama u jednoj šumećoj tableti.

Aspartam je izvor fenilalanina. Može Vam naškoditi ako bolujete od fenilketonurije, rijetkog genetskog poremećaja kod kojeg dolazi do nakupljanja fenilalanina jer ga tijelo ne može ukloniti na odgovarajući način.

LUPOCET FLU FORTE sadrži sorbitol.

Ovaj lijek sadrži 212 mg sorbitola u jednoj šumećoj tableti.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LUPOCET FLU FORTE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Ne uzimajte veću dozu od preporučene bez savjetovanja s liječnikom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzimajte 1 šumeću tabletu svakih 4-6 sati. Prema potrebi možete uzeti 2 šumeće tablete odjednom svakih 6-8 sati. Unutar 24 sata nemojte uzeti više od 8 šumećih tableta.

Stariji

Osobe starije životne dobi osobito se moraju pridržavati preporučenog doziranja, zbog povećane osjetljivosti na lijekove ovakve vrste.

Primjena u djece (mlađe od 12 godina)

LUPOCET FLU FORTE se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta.

LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon jela kako biste smanjili mogućnost nastanka probavnih smetnji.

LUPOCET FLU FORTE ima oblik šumeće tablete.

Jednu šumeću tabletu otopite u pola čaše vode.

Trajanje primjene

Ovaj lijek se primjenjuje kratkotrajno. Ne smijete uzimati ovaj lijek bez savjetovanja s liječnikom dulje od 3 dana (u slučaju vrućice) odnosno 5 dana (u slučaju boli).

Ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 dana liječenja, potražite savjet liječnika o nastavku liječenja.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET FLU FORTE

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4-6 sati. Nemojte uzeti uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako uzmete više LUPOCET FLU FORTE tableta nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, odmah se javite najbližoj medicinskoj ustanovi ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika jer postoji opasnost od odgođenog, ozbiljnog oštećenja jetre. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Predoziranje se najčešće može očitovati simptomima kao što su mučnina, povraćanje, znojenje, pospanost, tromost i usporeno disanje.

U slučaju primjene izrazito visokih doza može doći do teškog oštećenja jetre.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Pri pravilnoj primjeni LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nuspojave su rijetke.

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na pojavu alergijske reakcije u obliku kožnog osipa i svrbeža, otekline usnica i lica ili kratkog daha.

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- Ozbiljno stanje koje može povećati kiselost krvi (poznato kao metabolička acidoza) u bolesnika s teškom bolešću koji uzimaju paracetamol (vijdeti dio 2.)

Ostale zabilježene nuspojave su sljedeće:

- suha usta, probavne smetnje
- slabost
- pospanost, omaglica
- povećana gustoća sekreta iz dišnih putova
- otežano mokrenje, poremećaj rada bubrega
- osjetljivost na sunčevu svjetlost
- poremećaji krvne slike
- poremećaj rada jetre

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LUPOCET FLU FORTE

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon otvaranja, LUPOCET FLU FORTE treba čuvati u originalnom pakiranju .

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što LUPOCET FLU FORTE sadrži

- Djelatne tvari su paracetamol, askorbatna kiselina (vitamin C) i klorfenamin. Jedna šumeća tableta sadrži 500 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline (vitamina C) u obliku natrijevog askorbata, te 1,41 mg klorfenamina u obliku klorfenaminmaleata.
- Pomoćne tvari su: citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; sorbitol (E420); natrijev karbonat, bezvodni; aspartam (E951); aroma naranče; aroma limuna; povidon K30; simetikon emulzija (30 postotna).

Kako LUPOCET FLU FORTE izgleda i sadržaj pakiranja

LUPOCET FLU FORTE je bijela ili gotovo bijela, okrugla, ravna tableta. 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem.

Režim izdavanja:

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ

BELUPO Ijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5,
48 000 Koprivnica, Hrvatska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

BELUPO Ijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5,
48 000 Koprivnica, Hrvatska

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

04-07.3-2-4168/25, od 27.10.2025.godine

DATUM ZADNJE REVIZIJE

27.10.2025.godine