

## UPUTA ZA PACIJENTA

**IRUZID 20**  
**20 mg/12,5 mg tablete**  
*lizinopril/hidroklorotiazid*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

**Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je IRUZID i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati IRUZID?
3. Kako uzimati IRUZID?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati IRUZID?
6. Dodatne informacije

### **1. Što je IRUZID i za što se koristi?**

IRUZID se primjenjuje u liječenju povišenog krvnog tlaka (hipertenzije). Sadrži dvije djelatne tvari koje se zovu lizinopril i hidroklorotiazid.

Lizinopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju ACE-inhibitori i djeluje tako da širi krvne žile. Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju diuretici. Ovaj lijek pomaže tijelu da se oslobodi viška vode i soli kao što je natrij u urinu.

Ovi lijekovi djeluju zajedno kako bi snizili krvni tlak.

### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati IRUZID?**

**Nemojte uzimati IRUZID:**

- ako ste alergični na lizinopril, hidroklorotiazid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični na ACE inhibitore ili sulfonamide. Pitajte svog liječnika ukoliko niste sigurni.
- ako ste ikada imali iznenadno oticanje ruku, nogu, zglobova, lica, usana, jezika i/ili grla, osobito tijekom ranijeg liječenja s drugim lijekovima koji pripadaju skupini ACE-inhibitora, pri čemu ste otežano disali ili gutali
- ako imate nasljedni angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim reakcijama oticanja opisanim gore). Pitajte svog liječnika ukoliko niste sigurni.
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat)
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
  - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva;
  - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus);
  - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti.

- ako ste trudni više od 3 mjeseca (iako je bolje izbjegavati IRUZID i tijekom rane trudnoće - vidjeti dio **Trudnoća i dojenje**)
- ako imate ozbiljnih problema s bubrezima
- ako imate ozbiljnih problema s jetrom
- ako ste prestali mokriti
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

**Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati IRUZID. Ukoliko niste sigurni, obratite se svome liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.**

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete IRUZID:

- ako imate suženje (stenozu) aorte (aorta je najveća krvna žila koja izlazi iz srca), srčanih zalistaka (mitralni zalisci) ili bubrežne arterije
- ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičnu kardiomiopatiju)
- ako imate probleme s krvnim žilama (kolagenu vaskularnu bolest)
- ako imate niski krvni tlak (koji se može očitovati kao omaglica i ošamućenost, posebice pri ustajanju)
- ako imate bolest bubrega, odnosno idete na dijalizu ili imate presađen bubreg
- ako imate bolest jetre
- ako imate šećernu bolest
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
  - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima - primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
  - aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije u dijelu **Nemojte uzimati IRUZID**.

- ako ste nedavno imali proljev ili obilno povraćanje
- ako Vas je liječnik uputio da morate biti na dijeti sa smanjenim unosom soli
- ako imate povišenu razinu kolesterola te idete na tzv. LDL aferezu
- ako imate sistemski eritemski lupus (SLE)
- ako ste crne rase jer IRUZID u Vas može biti manje djelotvoran. Također morate biti spremni na veću učestalost nuspojave tzv. angioedem (teška alergijska reakcija koja se očituje oticanjem ruku, nogu, zglobova, lica, usnica, jezika i/ili grla).
- ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Ne preporučuje se primjena IRUZID tableta u ranoj trudnoći. Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, **ne smijete** uzimati IRUZID jer može ozbiljno naškoditi Vašem djetetu (vidjeti dio **Trudnoća i dojenje**).
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja lijeka IRUZID.
- ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja pritiska u oku, a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do sedmicu dana nakon uzimanja ovog lijeka. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog oštećenja vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamide, možete biti izloženi većem riziku od razvoja ove bolesti.

**Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.**

### **Liječenje alergija, npr. na ubode insekata**

Recite svom liječniku ukoliko idete ili namjeravate ići na postupak smanjenja alergijske reakcije npr. na ubode insekata (postupak desenzibilizacije). Ako uzimate IRUZID tijekom postupka desenzibilizacije, može se javiti teška alergijska reakcija.

### **Operativni zahvat**

Recite svom liječniku ili stomatologu ukoliko idete na neki operativni zahvat (uključujući i zahvate u usnoj šupljini) da uzimate IRUZID. Naime, ako se IRUZID tablete uzimaju istodobno s lokalnim ili općim anestheticima, može doći do kratkotrajnog pada krvnog tlaka.

### **Djeca i adolescenti**

IRUZID nije namijenjen za primjenu u djece.

### **Drugi lijekovi i IRUZID**

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. IRUZID može utjecati na učinkovitost drugih lijekova dok neki lijekovi mogu utjecati na učinak lijeka IRUZID. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza.

### **Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:**

- lijekove koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretike)
- neke druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka (antihipertenzive)
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije u dijelu **Nemojte uzimati IRUZID i Upozorenja i mjere opreza**)
- nesteroidne protuupalne lijekove koji se primjenjuju za liječenje artritisa i bolova, npr. indometacin
- acetilsalicilatnu kiselinu u dozi većoj od 3 g na dan
- lijekove za liječenje depresije (triciklički i tetraciklički antidepresivi)
- lijekove za liječenje psihičkih bolesti, uključujući litij
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
- inzulin ili lijekove za liječenje šećerne bolesti koji se uzimaju kroz usta (oralni antidijabetici)
- lijekove za liječenje astme
- lijekove koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali pripravci protiv simptoma prehlade (uključujući i one koji se mogu kupiti bez liječničkog recepta)
- lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma (imunosupresivi, npr. ciklosporin)
- alopurinol (lijek za liječenje gihta)
- lijekove za liječenje poremećaja otkucaja srca (npr. prokainamid)
- lijekove koji sadrže zlato, uključujući natrijev aurotiomalat, koji se primjenjuju u obliku injekcije
- lijekove za liječenje srčanih bolesti (npr. srčani glikozidi)
- amfotericin B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)
- karbenoksolon (lijek za liječenje vrieda (čira) jednjaka ili usta)
- kortikosteroide (lijekovi koji utječu na upalni odgovor organizma)
- kortikotropin (hormon)
- lijekove za liječenje zatvora stolice (laksative)
- lovastatin, kolestiramin i kolestipol (lijekovi za sniženje kolesterola u krvi, sprječavanje proljeva ili ublažavanje svrbeža)
- lijekove za opuštanje mišića (tubokurarin)
- trimetoprim (antibiotik)
- sotalol (beta-blokator)
- dekstran sulfat (lijek za liječenje stanja LDL afereze, za sniženje kolesterola u krvi)
- lijekove za liječenje zloćudnih bolesti (citostatike)
- ostale lijekove koji mogu izazvati poremećaj rada srca poznat kao *torsades de pointes*.

### **IRUZID s hranom i pićem**

IRUZID tablete možete uzimati neovisno o obroku.

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Liječnik će preporučiti prestanak primjene IRUZID tableta prije nego zatrudnite ili odmah nakon potvrde trudnoće te Vam savjetovati da umjesto IRUZID tableta uzmete drugi lijek. Ne preporučuje se primjena IRUZID tableta u ranoj trudnoći. Ako ste trudni dulje od 3 mjeseca, ne smijete uzimati IRUZID jer njegova primjena nakon trećeg mjeseca trudnoće može izazvati teško oštećenje djeteta. Obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti. Ne preporučuje se primjena IRUZID tableta u dojlja. Ako želite dojiti (osobito ako se radi o novorođenčetu ili nedonoščetu), liječnik može izabrati drugu terapiju.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ovaj lijek može ponekad uzrokovati omaglicu i umor što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, posebno na početku liječenja, tijekom prilagodbe doze ili pri istodobnoj primjeni s alkoholom. U slučaju reakcije na lijek, nemojte voziti niti koristiti alate ili strojeve. Prije navedenih aktivnosti preporučuje se da utvrdite kako reagirate na uzimanje ovog lijeka.

**IRUZID sadrži manitol** koji može imati laksativni učinak.

### **3. Kako uzimati IRUZID?**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Progutajte tabletu s dovoljnom količinom vode (1 čaša).

Potrudite se da uzmete tablete svaki dan u isto vrijeme. IRUZID tablete se mogu uzimati prije ili poslije jela.

Uzimajte ovaj lijek onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik. Radi se o dugotrajnom liječenju i važno je uzimati ovaj lijek svaki dan.

Kad započnete uzimati IRUZID Vaš liječnik može zatražiti da obavite krvne pretrage. Liječnik će zatim prilagoditi dozu kako biste uzeli odgovarajuću količinu ovog lijeka.

### **Uzimanje prve doze lijeka**

Budite osobito oprezni kada prvi puta uzmete IRUZID tablete ili prilikom povećanja doze. Može doći do jačeg pada krvnog tlaka nego kasnije tijekom liječenja.

To se može očitovati kao vrtoglavica i ošamućenost, a ti se simptomi mogu smanjiti ako legnete. Ukoliko Vas to zabrinjava, obratite se što prije svojem liječniku.

### **Odrasli**

Preporučena doza je jedna tableta jedanput na dan. Liječnik će propisati tabletu koja je prave jačine za Vas.

Ako je potrebno, liječnik Vam može povećati dozu na dvije tablete, primijenjene jedanput dnevno.

### **Primjena u djece**

IRUZID nije namijenjen za primjenu u djece.

### **Ako uzmete više IRUZID tableta nego što ste trebali**

Ako uzmete više IRUZID tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili otidite u bolnicu. Sa sobom ponesite tablete ili ovu uputu kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

### **Ako ste zaboravili uzeti IRUZID**

Ako ste zaboravili uzeti IRUZID, propuštenu dozu lijeka uzmite što prije. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

### **Ako prestanete uzimati IRUZID**

Nemojte prestati uzimati IRUZID unatoč tome što se dobro osjećate, sve dok Vam to liječnik ne kaže.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

IRUZID sadrži dva lijeka, lizinopril i hidroklorotiazid. Dolje navedene nuspojave zabilježene su uz primjenu pojedinog lijeka, stoga se mogu javiti i pri primjeni IRUZID tableta.

Vaš liječnik može s vremena na vrijeme zatražiti da obavite krvne pretrage. To je stoga kako bi provjerio ima li IRUZID utjecaj na Vašu krvnu sliku.

##### **Moguće nuspojave pri primjeni lizinoprila**

**Teške alergijske reakcije** (rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba).

Ako imate tešku alergijsku reakciju, **prestanite uzimati IRUZID i odmah se javite liječniku**. Simptomi mogu uključivati naglu pojavu:

- otekline lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje
- teškog ili naglog oticanja ruku, nogu ili gležnjeva
- otežanog disanja
- jak svrbež kože (s uzdignutim kvržicama).

**Težak poremećaj rada jetre** (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba).

Simptomi mogu uključivati sljedeće:

- žuta boja kože i bjeloočnica, tamno obojen urin ili gubitak teka.

Ako primjetite navedene simptome, **odmah se javite liječniku**.

##### **Ostale moguće nuspojave**

**Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):**

- glavobolja
- omaglica ili ošamućenost, osobito pri naglom ustajanju
- nesvjestica
- proljev
- povraćanje
- kašalj
- bubrežne tegobe (koje se vide u krvnim pretragama).

**Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):**

- promjene raspoloženja, uključujući simptome depresije
- osjećaj štipkanja poput trnaca i iglica
- promjena boje prstiju na rukama i nogama
- promjena osjeta okusa
- vrtoglavica
- poteškoće sa spavanjem
- moždani ili srčani udar
- poremećen rad srca
- curenje iz nosa
- mučnina
- bolovi u trbuhu i poremećaj probave
- kožni osip
- svrbež
- problemi s erekcijom (impotencija)
- osjećaj umora

- osjećaj slabosti (gubitak snage)
- odstupanja u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre
- povišene vrijednosti nekih tvari u krvi (uree, kreatinina ili kalija).

**Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):**

- zbunjenost
- promjena osjeta mirisa
- suha usta
- koprivnjača (urtikarija)
- gubitak kose
- psorijaza
- promjene nekih stanica ili drugih dijelova krvi s pojavom umora i bljedoćom kože
- infekcija krvi
- nagli poremećaj rada bubrega
- povećanje dojki u muškaraca
- sindrom neprimjerenog lučenja antidiuretskog hormona
- snižene vrijednosti natrija u krvi što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje i grčeve.

**Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):**

- poremećaj koštane srži ili smanjenje broja krvnih stanica i krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja može biti teška), vrućicu, osjećaj zaduhe ili lakšu pojavu modrica ili krvarenja
- otečene žlijezde (povećanje limfnih čvorova)
- pojačan imunološki odgovor organizma (autoimuna bolest)
- pad razine šećera u krvi (hipoglikemija). Znakovi mogu obuhvaćati osjećaj gladi ili slabosti, znojenje i ubrzan rad srca.
- iznenadno piskanje, zviždanje u prsima ili kratak dah (bronhospazam)
- upala pluća (zbog koje možete osjećati nedostatak zraka)
- upala sinusa (bol i osjećaj punoće u području iza obraza ili očiju)
- upala pluća s povećanim brojem krvnih stanica, eozinofila (eozinofilna upala pluća). Znakovi uključuju kombinaciju sljedećeg:
  - upala sinusa
  - stanje poput gripe
  - osjećaj sve većeg nedostatka zraka
  - bol u području želuca ili crijeva
  - kožni osip
  - osjećaj trnaca i iglica ili obamrlosti u nogama ili rukama.
- upala gušterače, koja je praćena umjerenom do jakim boli u truhu
- oticanje stjenke crijeva, praćene naglom boli u želucu, proljevom ili mučninom (povraćanjem)
- teške promjene kože ili osip, uključujući crvenilo, pojavu mjehura i ljuštenje kože, što se može razviti naglo i može zahvatiti ljuštenje usne i nosne šupljine
- znojenje
- smanjeno mokrenje ili potpuni prestanak mokrenja.

**Nepoznato ( učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):**

- vidni, osjetilni ili slušni doživljaji koji nisu prisutni u stvarnosti (halucinacije)
- crvenilo kože uz osjećaj vrućine.

**Moguće nuspojave pri primjeni hidroklorotiazida**

**Nepoznato ( učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):**

- upala žlijezde slinovnice
- smanjenje broja krvnih stanica i/ili krvnih pločica, što može uzrokovati umor, infekciju (koja može biti ozbiljna), vrućicu, osjećaj zaduhe ili lakšu pojavu modrica ili krvarenja
- gubitak teka

- povišenje razine šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija)
- pojava šećera u urinu
- povišena razina urične kiseline u krvi
- promjene razine nekih tvari u krvi (npr. natrija i kalija) uz pojavu mišićne slabosti, žeđi, osjećaja trnaca i iglica, grčeva ili mučnine
- povišene ili visoke vrijednosti masti u krvi (uključujući kolesterol)
- osjećaj nemira
- depresija
- poteškoće spavanja
- osjećaj štipkanja poput trnaca i iglica
- ošamućenost
- kratkotrajno zamagljen vid ili poremećaj vida kada stvari izgledaju žuto
- kratkotrajni problemi s vidom
- jaka bol u očima sa crvenilom i iznenadnim zamagljenjem vida. Ako se jave iznenadna bol i crvenilo oka, odmah obavijestite svojeg liječnika. Možda će Vam biti potrebno liječenje kako biste izbjegli trajni gubitak vida.
- vrtoglavica
- nesvjestica (posebno pri ustajanju)
- oštećenje krvnih žila s pojavom crvenih ili ljubičastih mrlja po koži
- poteškoće s disanjem. Može se javiti osjećaj nedostatka zraka zbog upale pluća ili prisutnosti tekućine u njima.
- iritacija želuca
- proljev
- zatvor stolice
- upala gušterače s pojavom umjerene do jake boli u truhu
- žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica)
- kožni problemi uključujući osip uzrokovan osjetljivošću na sunčevu svjetlost, težak oblik osipa s naglim nastankom, uz pojavu mjehura ili ljuštenja kože te pojavom mjehura u ustima, aktivacija ili pogoršanje postojećeg lupusa ili pojava neobičnih kožnih reakcija
- alergijske reakcije
- grčevi mišića i slabost mišića
- poremećaj bubrega, koji može biti ozbiljan (vidljivo iz krvnih pretraga)
- vrućica
- slabost (gubitak snage)
- rak kože i usana (nemelanomski rak kože)
- oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog pritiska (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta)

Nemojte biti zabrinuti zbog gore navedenih nuspojava. Možda se kod Vas neće pojaviti niti jedna.

#### **Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka**

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### **5. Kako čuvati IRUZID 20 tablete?**

Iruzid 20 tablete čuvajte van dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte na temperaturi do 25<sup>0</sup> C.

#### **Rok trajanja**

Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

Iruzid 20 tablete ne smijete primijeniti nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju!

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

## 6. Dodatne informacije

### Šta sadrže Iruzid 20 tablete?

Jedna Iruzid 20, tableta sadrži: 20 mg lizinopрила u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance:

Manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, škrob prethodno geliran, magnezijev stearat; željezo oksid žuti (E172).

### Kako Iruzid 20 tablete izgledaju i sadržaj pakovanja:

Iruzid 20 su žute, bikonveksne, heksagonalne tablete.  
30 tableta u jednom PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

### Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

### Proizvođač:

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO  
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

### Proizvođač gotovog lijeka:

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO  
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

### Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO  
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

### Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

IRUZID 20, tablete 20/12.5mg : 04-07.3-2-10699/21 od 25.07.2022. godine

Datum revizije teksta: 25.07.2022. godine