

UPUTA O LIJEKU

NEOFEN FORTE

400 mg, filmom obložena tableta

ibuprofen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom farmaceutu.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Ako ste odrasli bolesnik, obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana u slučaju vrućice i nakon 5 dana u slučaju boli.
- Za adolescente se obavezno obratite ljekaru ako se ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 3 dana.

Šta se nalazi u ovoj uputi:

1. Šta su NEOFEN FORTE filmom obložene tablete i za šta se koriste?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?
3. Kako uzimati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Šta su NEOFEN FORTE filmom obložene tablete i za šta se koriste?

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete sadrže djelatnu tvar ibuprofen koji pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi ili NSAR lijekovi.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete namijenjene su za odrasle i adolescente starije od 12 godina (tjelesne težine veće od 40 kg).

Koriste se za kratkotrajno simptomatsko liječenje:

- blage do umjerene boli poput glavobolje (uključujući migrenu), neuralgije, zubobolje, boli u ledima, mišićima i zglobovima i menstrualne boli
- snižavanje povišene tjelesne temperature te ublažavanje bolova i tegoba uslijed obične prehlade i gripe.

Ako ste odrasli bolesnik, obavezno se obratite ljekaru ako se simptomi ne povuku ili se pogoršaju, ili ako je NEOFEN FORTE filmom obložene tablete potrebno primjenjivati duže od 3 dana u slučaju vrućice i duže od 5 dana u slučaju boli.

Za adolescente se mora posavjetovati s ljekarom ukoliko se simptomi pogoršaju, ili ako je NEOFEN FORTE filmom obložene tablete potrebno primjenjivati duže od 3 dana.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?

Nemojte uzimati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete:

- ako ste alergični na ibuprofen ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste bolovali od reakcija preosjetljivosti (astma, rinitis, angioedem ili urtikarija) na acetilsalicilatnu kiselinsku ili druge protuupalne lijekove
- ako ste ranije imali krvarenja ili puknuća u probavnom sistemu povezana s primjenom lijekova iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova

- ako imate čir na želucu/dvanaesniku ili krvarenje u probavnom sistemu ili ste imali ponavljajući čir na želucu/dvanaesniku ili krvarenje u probavnom sistemu (dvije ili više dokazanih epizoda čireva ili krvarenja)
- ako imate teško srčano zatajenje
- ako imate teško zatajenje jetre
- ako imate teško zatajenje bubrega
- ako imate povećanu sklonost krvarenju ili aktivno krvarenje (uključujući krvarenje u mozgu)
- ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće
- ako ste mlađi od 12 godina (ispod 40 kg tjelesne težine).
- ako imate tešku dehidraciju (izraženi gubitak vode iz tijela uzrokovanu povraćanjem, proljevom ili nedostatnim unosom tekućine).

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete NEOFEN FORTE filmom obložene tablete:

- ako ste trudni ili dojite
- ako ste starije životne dobi jer je veća mogućnost pojave nuspojava (osobito krvarenja, čireva ili puknuća u probavnom sistemu koja mogu imati smrtni ishod) i rizik od oštećenja bubrega.
- ako ste imali oboljenja probavnog sistema budući je moguće pogoršanje bolesti. Krvarenja, čirevi i puknuća u probavnom sistemu mogući su bilo kada tijekom liječenja, mogu imati i smrtni ishod i mogu se javiti s ili bez upozoravajućih simptoma i bez obzira na prijašnju povijest bolesti. U ovom slučaju, ili ako Vam je nužna terapija acetilsalicilatnom kiselinom u niskoj dozi ili drugim lijekovima koji mogu povećati rizik od nuspojava u probavnom sistemu (npr. oralni kortikosteroidi, antikoagulansi (npr. varfarin), selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili antitrombotici) možda će biti potrebna kombinirana terapija s tzv. zaštitnim lijekovima.
- ako tijekom primjene NEOFEN FORTE tableta, posebno na početku liječenja, osjetite bilo kakav neuobičajeni simptom u trbuhu, obratite se ljekaru. Ako tijekom primjene NEOFEN FORTE tableta dođe do krvarenja ili čireva u probavnom sustavu, odmah prekinite uzimanje lijeka i obratite se ljekaru.
- ako ste imali ili bolujete od kroničnih upalnih bolesti crijeva (ulcerozni kolitis, Crohnova bolest)
- ako imate ili ste imali poremećaje dišnog sustava (astma, kronični rinitis, alergijske reakcije). NEOFEN FORTE filmom obložene tablete mogu povećati rizik od bronhospazma (stezanje dušnica), urtikarije ili angioedema.
- ako imate vodene kozice (lat. varicella)
- ako ste ranije imali ili imate peludnu groznicu, nazalne polipe ili kroničnu opstruktivnu respiratornu bolest, postoji povećan rizik od alergijske reakcije i na ibuprofen, čak i anafilaktičkog šoka. Na prvi znak alergijske reakcije prekinite uzimanje lijeka i obratite se ljekaru.
- ako imate ili ste imali povišeni krvni pritisak ili zatajenje srca, jer je moguć nastanak edema (otoka)
- ako imate oštećenu funkciju bubrega jetre ili srca s obzirom da primjena lijekova, kao što su NEOFEN FORTE filmom obložene tablete, može uzrokovati pogoršanje funkcije bubrega. Taj je rizik povećan i ako uzimate razne lijekove protiv bolova ili neke lijekove za snižavanje visokog tlaka. Doza ibuprofena bi trebala biti najniža moguća, a potrebno je i često kontroliranje funkcije bubrega. Nakon prekida liječenja, obično slijedi oporavak funkcije bubrega.
- ako imate dehidraciju (gubitak vode iz tijela uzrokovan povraćanjem, proljevom ili nedostatnim unosom tekućine) jer postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega, osobito u djece, adolescenata i starijih osoba
- ako ste skloni krvarenju i/ili uzimate lijekove koji utječu na zgrušavanje krvi. NEOFEN FORTE filmom obložene tablete mogu produljiti vrijeme krvarenja.
- ako bolujete od sistemskog eritematoznog lupusa i drugih bolesti vezivnog tkiva. Istodobna primjena NEOFEN FORTE tableta može povećati rizik od pojave aseptičkog meningitisa.
- ako imate naslijednu bolest nepodnošenja nekih šećera.
- **ako imate infekciju - vidjeti dio „Infekcije“ u nastavku.**

Kao i drugi protuupalni lijekovi iz iste skupine, i NEOFEN FORTE filmom obložene tablete mogu sakriti simptome infekcije.

Infekcije

NEOFEN FORTE može prikriti znakove infekcija kao što su vrućica i bol. Stoga je moguće da NEOFEN FORTE može odgoditi odgovarajuće liječenje infekcije, što može dovesti do povećanog rizika od komplikacija. To je opaženo kod upale pluća uzrokovane bakterijama i bakterijskih kožnih infekcija povezanih s vodenim kozicama. Ako uzimate ovaj lijek dok imate infekciju, a simptomi infekcije ustraju ili se pogoršaju, odmah se obratite ljekaru.

Tijekom produljene primjene analgetika može se pojaviti glavobolja koja se ne smije liječit povišenim dozama lijeka.

Srčani ili moždani udar

Protuupalni lijekovi/lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja.

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete NEOFEN FORTE filmom obložene tablete ako:

- imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući "mini moždani udar" ili prolazni ishemijski napadaj).
- imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji, ili ako ste pušač.

Kožne reakcije

Ozbiljne kožne reakcije prijavljene su povezano s liječenjem lijekom NEOFEN FORTE. Potrebno je prekinuti uzimanje lijeka NEOFEN FORTE i odmah potražiti pomoć ljekara ako Vam se pojavi bilo kakav osip na koži, oštećenje sluznice, mjehurići ili drugi znakovi alergije jer to mogu biti prvi znakovi vrlo ozbiljne kožne reakcije. Vidjeti dio 4.

Djeca i adolescenti

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete nisu prikladne za djecu mlađu od 12 godina (tjelesne težine ispod 40 kg). Za doziranje u djece postoje prikladniji oblici (tekući). Postoji povećan rizik od oštećenja bubrega u dehidrirane djece i adolescenta.

Drugi lijekovi i NEOFEN FORTE filmom obložene tablete

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete mogu utjecati na druge lijekove ili na njega mogu utjecati drugi lijekovi.

Primjerice:

- drugi protuupalni lijekovi za ublažavanje bolova, uključujući i selektivne inhibitore ciklooksigenaze 2 (COX-2)
- srčani glikozidi (digoksin)
- kortikosteroidi (za liječenje upala)
- lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razređuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi primjerice, aspirin/acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin)

- antitrombotici (klopidogrel i tiklopidin)
- selektivni inhibitori ponovne pohrane serotoninina
- litij
- lijekovi koji snižavaju visok krvni pritisak (ACE-inhibitori poput kaptoprla, beta-blokatori poput atenolola, antagonisti receptora angiotenzina-II kao što je losartan)
- diuretici (lijekove za izmokravanje)
- metotreksat
- ciklosporin i takrolimus (imunosupresivni lijekovi koji se koriste nakon presađivanja organa, ili za liječenje autoimunih bolesti)
- zidovudin (antivirusni lijek)
- antibiotici koji se nazivaju kinoloni
- lijekovi koji inhibiraju enzim CYP2C9, npr. vorikonazol ili flukonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija)
- lijekovi iz skupine sulfoniluree (za liječenje šećerne bolesti)
- kolestiramin (za liječenje visokih razina kolesterola)
- antibiotici koji se nazivaju aminoglikozidi
- biljni preparati koji sadrže Gingko bilobu
- mifepriston
- alkohol
- fenitoin (za liječenje epilepsije)
- probenecid i sulfpirazon

Liječenje NEOFEN FORTE tabletama moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli utjecati na NEOFEN FORTE filmom obložene tablete. Uvijek provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe lijeka NEOFEN FORTE filmom obložene tablete zajedno s drugim lijekovima.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete s hranom, pićem i alkoholom

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete se mogu uzimati tijekom ili nakon obroka.

Tijekom istodobne primjene alkohola, mogu se povećati nuspojave NSAR lijekova, posebice one povezane s probavnim ili središnjim živčanim sustavom. Također, u većoj mjeri u kombinaciji s alkoholom ibuprofen može utjecati na Vaše vrijeme reagiranja tj. budnost.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom prvih šest mjeseci trudnoće ibuprofen se ne smije primijeniti osim u neophodnim situacijama po savjetu ljekara. Ibuprofen se ne smije koristiti u posljednjem tromjesečju trudnoće.

Ne preporučuje se primjena ibuprofena tijekom dojenja.

Uporaba ibuprofena može smanjiti plodnost žena i ne preporučuje se kod žena koje pokušavaju začeti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ibuprofen može utjecati na Vaše vrijeme reagiranja. Može izazvati omaglicu, umor, pospanost i smetnje vida. Potreban je oprez kod upravljanja vozilima, strojevima ili obavljanja poslova koji zahtijevaju budnost. Ovo vrijedi u većoj mjeri kada se ibuprofen koristi u kombinaciji s alkoholom.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete sadrže laktozu.

Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete sadrže boju carmoisine (E122) koja može izazvati alergijsku reakciju.

3. Kako uzimati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Najnižu učinkovitu dozu potrebno je primjenjivati tijekom najkraćeg razdoblja potrebnog za ublažavanje simptoma. Ako imate infekciju, odmah se obratite ljekaru ako simptomi (kao što su vrućica i bol) ustraju ili se pogoršaju (vidjeti dio 2.).

Ovaj je lijek namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu. Morate uzimati najnižu moguću dozu kroz najkraće moguće vrijeme potrebno za uklanjanje simptoma.

Lijek je primjereno za odrasle i adolescente starije od 12 godina (tjelesne težine veće od 40 kg).

Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (tjelesne težine ≥40 kg): 1 tableta (400 mg) u pojedinačnoj dozi, do tri puta na dan s razmakom između doza od 4 do 6 sati.

Maksimalna pojedinačna doza za odrasle i adolescente ne smije biti veća od 400 mg ibuprofena. Više od 400 mg odjednom ne daje bolji analgetski učinak.

Ne smije proći manje od 4 sata između pojedinačnih doza.

Za odrasle i adolescente, ukupna dnevna doza od 1200 mg ne smije se premašiti u bilo kojem 24- satnom periodu.

Ako ste odrasli bolesnik, obavezno se obratite ljekaru ako se simptomi ne povuku ili se pogoršaju, ili ako je NEOFEN FORTE filmom obložene tablete potrebno primjenjivati duže od 3 dana u slučaju vrućice i duže od 5 dana u slučaju boli.

Za adolescente se mora posavjetovati s ljekarom ukoliko se simptomi pogoršaju, ili ako je NEOFEN FORTE filmom obložene tablete potrebno primjenjivati duže od 3 dana.

Djeca: NEOFEN FORTE u obliku tableta od 400 mg nije prikladan za djecu mlađu od 12 godina (tjelesne težine manje od 40 kg).

Za doziranje u djece postoje prikladniji oblici (tekući).

Stariji: Nije potrebna posebna prilagodba doze, no potreban je oprez zbog mogućih nuspojava. Potrebno je potražiti savjet ljekara.

Oštećenje funkcije bubrega i jetre: Nije potrebno smanjenje doze ako imate blago do umjerenog oštećenja bubrežne ili jetrene funkcije. U slučaju teškog zatajenja bubrega ili jetre, ne smijete uzimati ovaj lijek. Potrebno je potražiti savjet ljekara.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

NEOFEN FORTE filmom obložene tablete treba uzeti s dosta tekućine tijekom ili nakon obroka. Tablete se trebaju progrutati cijele te se ne smiju žvakati, lomiti, drobiti ili sisati kako bi se izbjegao neugodan osjećaj u ustima i iritacija grla.

Kako bi se postigao brži početak djelovanja, doza se može uzeti na prazan želudac. Ako imate osjetljiviji želudac preporučuje se uzimanje NEOFEN FORTE tableta s hranom.

Ako uzmete više NEOFEN FORTE tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više NEOFEN FORTE tableta nego što ste trebali, ili ako su djeca slučajno uzela lijek, obratite se ljekaru ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupku koji će se poduzeti.

Simptomi mogu uključivati mučninu, bol u trbuhi, povraćanje (prošarano krvlj), glavobolju, zujanje u ušima, smetenost i nekontroliran pokret oka. Pri visokim dozama zabilježeni su omamljenost, bol u

prsnom košu, osjećaj lupanja srca, gubitak svijesti, konvulzije (uglavnom u djece), slabost i omaglica, krv u mokraći, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem.

Ako ste zaboravili uzeti NEOFEN FORTE filmom obložene tablete

Ako zaboravite uzeti lijek, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, обратите se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava, odmah prestanite s uzimanjem lijeka i obavijestite Vašeg ljekara:

- kožni osip, ozljede sluznica ili drugi znakovi preosjetljivosti kože
- oticanje lica, jezika, grla, poteškoće s disanjem (angioedem, anafilaktički šok)
- pojava ili pogoršanje znakova infekcije (npr. nekroza mekih tkiva i veziva), posebno uz vodene kozice
- jaka glavobolja, povišena tjelesna temperatura, ukočenost vrata i preosjetljivost na svjetlost
- krvava stolica
- izrazito tamno obojena stolica (kao katran)
- povraćanje svježe krvi ili tamnih komadića koji izgledaju kao zrna kave.
- crveni, ljuškavi, prošireni osip s krvžicama ispod kože i mjehurićima uglavnom lokaliziran na naborima kože, trupu i gornjim udovima popraćen vrućicom na početku liječenja (akutna generalizirana egzantematozna pustuloza) (učestalost: nepoznato). Prestanite primjenjivati lijek NEOFEN FORTE u slučaju nastanka tih simptoma i odmah potražite pomoć ljekara. Vidjeti također dio 2.

Sljedeće nuspojave se mogu pojaviti pri primjeni ovog lijeka:

Česte (mogu se pojaviti između 1 i 10 na 100 bolesnika)

- omaglica, glavobolja
- loša probava, proljev, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, nadutost, zatvor, krv u stolici, povraćanje krvi, krvarenje u probavnom sistemu
- osip
- umor.

Manje česte (mogu se pojaviti između 1 i 10 na 1000 bolesnika)

- curenje iz nosa (rinitis)
- preosjetljivost
- nesanica, tjeskoba
- neobični osjeti na koži kao što su utrnulost, trnci, bockanje, žarenje ili mravinjanje (parestezija), jaka pospanost
- smetnje vida
- smetnje sluha, zujanje u ušima, vrtoglavica (vertigo)
- astma, stezanje dušnica (bronzospazam), dispneja
- gastritis, čir na dvanaesniku/želucu, vrijed (ulceracije) u ustima, puknuća u probavnom sistemu
- upala jetre (hepatitis), žutica, poremećaj funkcije jetre
- urtikarija, svrbež, purpura, angioedem, fotosenzitivnost.

Rijetke (mogu se pojaviti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

- aseptički meningitis
- poremećaji krvi i limfnog sustava (leukopenija, trombocitopenija, aplastična anemija, neutropenija, agranulocitoza i hemolitička anemija)
- anafilaktična reakcija
- depresija, stanje zbnjenosti, halucinacije

- optički neuritis
- toksična optička neuropatija
- ozljeda jetre
- edem.

Vrlo rijetke (mogu se pojaviti u manje od 1 na 10000 bolesnika)

- zatajenje srca, infarkt miokarda
- povišeni krvni pritisak
- upala gušterića
- zatajenje jetre
- teške reakcije preosjetljivosti (simptomi mogu biti: oticanje lica, jezika i grla, dispneja, tahikardija, hipotenzija do razine životno ugrožavajućeg šoka)
- teške kožne reakcije (npr. multiformni eritem, bulozne reakcije uključujući Stevens-Johnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu)
- različiti oblici toksičnosti za bubrege, uključujući tubulointersticijski nefritis, nefrotski sindrom i zatajenje bubrega.

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- kolitis i Crohnova bolest.
- može se pojaviti teška kožna reakcija poznata kao sindrom DRESS. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, vrućicu, oticanje limfnih čvorova i povećanje razine eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica).
- koža postaje osjetljiva na svjetlost - nepoznata učestalost.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati NEOFEN FORTE filmom obložene tablete?

NEOFEN FORTE čuvajte izvan pogleda i dohvata djece!

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

NEOFEN FORTE se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Šta sadrži NEOFEN FORTE tableta?

Djelatna tvar je ibuprofen.

Jedna NEOFEN FORTE filmom obložena tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete: laktosa hidrat; škrob, prethodno geliran; povidon; celuloza, mikrokristalična; karmelozanatrij, umrežena; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijev stearat.

Film - ovojnica: talk; makrogol 6000; boja titanijev dioksid (E171); hipromeloza; poliakrilat, 30 postotna disperzija; boja carmoisine (E122).

Kako NEOFEN FORTE tableta izgleda i sadržaj pakiranja

Tamno ružičasta, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta.

10 (1x10) tableta u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanjska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanjska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanjska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet

04-07.3-2-1970/21 od 01.10.2021. godine

Datum revizije teksta

10/2021.